

Forbruk av antibiotika

2017 - 2024

HELSE SØR-ØST RHF




Nasjonalt senter
for antibiotikabruk
i sykehus (NSAS)



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Sør-Øst RHF

korrigert for liggedøgn





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Sør-Øst RHF


Antall DDD, **ikke** korrigert for aktivitet





Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika Helse Sør-Øst RHF 2017 - 2024


korrigert for liggedøgn



Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika* pr HF/sykehus i Helse SørØst RHF

korrigert for liggedøgn

*summen av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner





Summen av forbruket av penicillin med enzymhemmer, 2. og 3. gen cefalosporiner, karbapenemer og kinoloner oppgitt som DDD/100 liggedøgn.

Antibiotikaforbruk er hentet fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) og liggedøgn fra Norsk Pasientregister (NPR)


	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sørlandet sykehus HF	17,88	16,14	15,20	15,23	16,91	18,97	18,42	17,97
Sykehuset Telemark HF	14,36	14,91	11,98	14,44	16,39	19,81	18,11	18,07
Sykehuset i Vestfold HF	16,89	19,83	19,12	19,24	20,37	19,97	19,54	19,51
Vestre Viken HF	18,16	18,08	16,72	15,26	15,96	17,66	18,21	17,16
Sunnaas sykehus	1,50	1,02	1,03	1,72	1,91	2,35	1,92	2,53
Diakonhjemmet sykehus	17,48	14,40	14,23	13,21	14,56	15,04	16,23	16,93
Lovisenberg diakonale sykehus	16,41	15,79	14,20	15,41	17,40	20,11	17,98	18,69
Oslo Universitetssykehus HF	15,31	14,87	14,44	15,08	15,19	16,08	15,30	15,62
Akershus Universitetssykehus HF	17,77	16,00	16,26	16,47	17,27	18,02	16,34	16,26
Sykehuset Innlandet HF	15,23	14,90	13,52	14,96	14,34	17,99	16,43	17,16
Sykehuset Østfold HF	21,21	19,00	16,97	17,77	20,22	21,44	18,66	19,26



Forbruk av foretrukne antibiotika (utvalgte penicilliner og aminoglykosider)


Helse Sør-Øst RHF

korrigert for liggedøgn






Fordeling mellom foretrukne og resistensdrivende antibiotika Helse Sør-Øst RHF



Fordeling mellom antibiotikagrupper (%-andel av totalforbruk) Helse Sør-Øst RHF

i "Annet" inngår fidaxomycin, kloramfenikol, aztreonam, kolistin, fusidin, nitrofurantoin, fosfomycin, linezolid, daptomycin og tedizolid






Totalforbruk av antibiotika Helse Sør-Øst RHF

korrigert for liggedøgn

I totalforbruket inngår ATC-gruppe J01 + vancomycin po, fidaxomycin og metronidazol po





- Periode: 2017 - 2024
- Forbruket er basert på salgstall fra Sykehusapotekenes Legemiddelstatistikk (SLS) hentet ut i februar 2025.
- Forbruket er angitt i definerte døgndoser (DDD).
Les mer om dette på www.whocc.no
- Aktivitetsdata i form av liggedøgn og innleggelser/døgnopphold er innhentet fra Norsk pasientregister (NPR).
- Statistikken omfatter kun somatikk, psykiatri er ikke inkludert hverken i forbruksdata eller aktivitetsdata

Rapporten er utarbeidet av spesialrådgiver/farmasøyt Marion Neteland ved Nasjonalt senter for antibiotikabruk i sykehus.

epost: marion.iren.neteland@helse-bergen.no