

Quiz om antibiotikaprofylakse

For noen av spørsmålene er flere svaralternativer riktige

- 1) **Hva betyr ordet profylakse?**
 - a. For y-akse
 - b. Før operasjon
 - c. Forebygging
 - d. Forberede

- 2) **Når er det indikasjon for å gi antibiotikaprofylakse?**
 - a. Når det er høy sannsynlighet for infeksjon, og/eller konsekvensene for pasienten kan bli store
 - b. Når det er mye personell til stede under operasjonen
 - c. Når pasienten har høy sannsynlighet for å være bærer av multiresistente bakterier
 - d. Når operasjonen skjer på natt

- 3) **Hvilket antibiotikum er førstevalg for å dekke for hudflora?**
 - a. Cefazolin
 - b. Benzylpenicillin
 - c. Kloksacillin
 - d. Meropenem

- 4) **Hva kan være konsekvensene av feil bruk av antibiotikaprofylakse?**
 - a. Økt antibiotikaforbruk og resistens
 - b. Økt forekomst av postoperative infeksjoner
 - c. Økt liggetid og økte kostnader
 - d. Økt sykkelighet og dødelighet

- 5) **Hva står forkortelsen NOIS for?**
 - a. Nordisk Infeksjons-Samarbeid
 - b. Norsk Organisasjon for Infeksjoner i Sår
 - c. Norwegian Organization for Infection prevention and Sustainability
 - d. Norsk overvåkningssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner

- 6) **Når skal antibiotikaprofylakse med cefazolin administreres?**
 - a. Kvelden før operasjonen
 - b. 30 (+/- 15) minutter før knivstart
 - c. Ved knivstart
 - d. 60 (+/- 15) minutter før knivstart

- 7) **Hvor kommer bakteriene som medfører postoperative infeksjoner vanligvis fra?**
- Operasjonspersonellet
 - Pasienten selv
 - Luften i operasjonssalen
 - Urent kirurgisk utstyr
- 8) **Hvilket antibiotika-regime er førstevalg som profylakse ved inngrep i mage/tarm?**
- Piperacillin+ tazobactam
 - Sulfametoksazol + trimetoprim
 - Ampicillin + gentamicin + metronidazol
 - Doksisyklin + metronidazol
- 9) **Hvilke kirurgiske inngrep registreres i NOIS-POSI?**
- Keisersnitt (sectio), operasjoner i mage/tarm (GI-inngrep), plastikkirurgiske og nevrokirurgiske inngrep
 - Alle ortopediske inngrep
 - Hjerteoperasjoner (aortakoronar bypass), keisersnitt, innsetting av proteser i hofteledd, fjerning av galleblære (kolecystektomi) og inngrep på tykktarm (kolon)
 - Alle operasjoner i mage/tarm
- 10) **Kan pasienter med penicillinallergi få cefazolin?**
- Nei, aldri
 - Ja, men bare hvis de ikke har hatt en alvorlig senreaksjon (DRESS/SCAR) på penicillin
 - Ja, men bare hvis de har vært testet for cefazolin
 - Ja, men bare hvis pasientene har med seg EpiPen



LYKKE TIL!

Klok bruk av antibiotika – du kan gjøre en forskjell